


<p>🔍 Title:</p> <p>🔍 Derwent Title:</p> <p>🌐 Country:</p> <p>🔍 Kind:</p> <p>🔍 Inventor:</p> <p>🔍 Assignee:</p> <p>🔍 Published / Filed:</p> <p>🔍 Application Number:</p> <p>🔍 IPC Code:</p> <p>🔍 ECLA Code:</p> <p>🔍 Priority Number:</p> <p>🔍 Abstract:</p> <p>🔍 INPADOC</p> <p>Legal Status:</p>	<p>EP0624599A2: Derivatives of mono (6-amino-deoxy)cyclodextrin substituted in position 6 with an alpha aminoacid group, process of their preparation and applications[German][French]</p> <p>New amino-cyclodextrin derivs. contg. aminoacid residue - used as water-soluble complexing agents, e.g. for solubilising or stabilising pharmaceuticals or cosmetic agents [Derwent Record]</p> <p>EP European Patent Office (EPO)</p> <p>A2 Publ. of Application without search report ⁱ (See also: EP0624599A3, EP0624599B1)</p> <p>Galons, Hervé; Gnaim, Jallal; Maignan, Jean;</p> <p>L'OREAL 🌳 <i>Corporate Tree data:</i> L'Oreal S.A. (L'OREAL); News, Profiles, Stocks and More about this company</p> <p>1994-11-17 / 1994-05-11</p> <p>EP1994000401069</p> <p>Advanced: A61K 8/49; A61K 8/73; A61Q 7/00; A61Q 19/00; C07C 271/22; C08B 37/16; Core: A61K 8/30; A61K 8/72; C07C 271/00; C08B 37/00; more... IPC-7: A61K 7/48; C07C 271/22; C08B 37/16;</p> <p>A61K8/49F2; A61K8/73T; A61Q7/00; A61Q19/00; C07C271/22; C08B37/00M2B;</p> <p>1993-05-13 FR1993000005782</p> <p>Derivatives of mono(6-amino-6-deoxy)cyclodextrin substituted in position 6 by an α-aminoacid residue. These derivatives correspond to the following general formula: in which: CD denotes α, á or ±-cyclodextrin n is 0 or 1, and Z denotes a divalent radical chosen from: (i) -CH2-</p> <p>(ii) -O-CH2- (iii) -S-CH2-, (iv) and (v) -O-C6H4-CH2-. These derivatives find an application for the preparation of inclusion complexes of active substances and may be employed in various fields in particular in cosmetics, in dermatology and in pharmacy.</p> <p>Show legal status actions</p> <p>Legal Status Report</p>	 <p>High Resolution</p> <p>Low Resolution</p> <p>11 pages</p>
---	---	---

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Designated CH DE ES FR GB IT LI NL

Country:

Family: Show 10 known family members

Description [From equivalent EP0624599A3]

Expand description

La présente invention a pour objet de nouveaux dérivés de mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d' α -aminoacide, leur procédé de préparation et leurs utilisations dans différents domaines de l'industrie en particulier en cosmétique, pharmacie et dermatologie, ces nouveaux dérivés étant susceptibles de former des complexes d'inclusion.

+ EXEMPLES DE PREPARATION

+ EXEMPLE 1 : Préparation de la mono[N-(amino-4 carboxy-4butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLE 2 : Préparation de la mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLE 3 : Préparation de la mono[N-(amino-2'carboxy-2'éthyl-4-phényloxyméthylcarbonyl-1)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLES D'UTILISATION

+ EXEMPLE A : Complexe d'inclusion du minoxidil dans la mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLE B : Complexe d'inclusion du minoxidil dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLE C : Complexe d'inclusion du 5-fluorouracile dans la mono[N-(amino-4carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLE D : Complexe d'inclusion de l'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxy phényl]-2-naphtoïque dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

+ EXEMPLE E : Complexe d'inclusion de l'hydroxy-17 corticostérone dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Numéro de publication : **0 624 599 A2**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **94401069.3**

(51) Int. Cl.⁵ : **C08B 37/16, C07C 271/22, A61K 7/48**

(22) Date de dépôt : **11.05.94**

(30) Priorité : **13.05.93 FR 9305782**

(43) Date de publication de la demande :
17.11.94 Bulletin 94/46

(84) Etats contractants désignés :
CH DE ES FR GB IT LI NL

(71) Demandeur : **L'OREAL**
14, Rue Royale
F-75008 Paris (FR)


(72) Inventeur : **Galons, Hervé**
57, Boulevard de Vaugirard
F-75015 Paris (FR)
Inventeur : **Gnaim, Jallal**
Aart van der Leeuwlaan 966
NL-2624 LZ Delft (NL)
Inventeur : **Maignan, Jean**
8, rue Halévy
F-93290 Tremblay les Goneses (FR)

(74) Mandataire : **Stalla-Bourdillon, Bernard**
Cabinet Nony
29, rue Cambacérès
F-75008 Paris (FR)

(54) **Dérivés de mono (6-amino 6-désoxy)cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d'alpha-aminoacide, leur procédé de préparation et leurs utilisations.**

(57) **Dérivés de mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d'alpha-aminoacide.**

Ces dérivés répondent à la formule générale suivante :



dans laquelle :

CD représente l' α , β ou γ cyclodextrine

n est 0 ou 1, et


Z représente un radical divalent choisi parmi :

(i) $\text{-CH}_2\text{-}$

(ii) $\text{-O-CH}_2\text{-}$

(iii) $\text{-S-CH}_2\text{-}$,

(iv)



et

(v) $\text{-O-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{-}$.

Ces dérivés trouvent une application pour la formation de complexes d'inclusion de substances actives et peuvent être utilisés dans différents domaines en particulier en cosmétique, en dermatologie et en pharmacie.

EP 0 624 599 A2

La présente invention a pour objet de nouveaux dérivés de mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d' α -aminoacide, leur procédé de préparation et leurs utilisations dans différents domaines de l'industrie en particulier en cosmétique, pharmacie et dermatologie, ces nouveaux dérivés étant susceptibles de former des complexes d'inclusion.

5 Ces nouveaux dérivés de cyclodextrine peuvent également trouver des applications dans d'autres domaines notamment en chimie analytique, dans l'industrie agro-alimentaire et également comme agent séquestrant de certains métaux de transition.

L'utilisation de molécules véhiculaires susceptibles d'accroître la solubilité en milieu aqueux de substances lipophiles ou de stabiliser des substances réputées instables en milieu aqueux ou encore d'obtenir une libération ciblée en fonction du temps ou du milieu environnant d'un principe actif est tout particulièrement recherchée dans les domaines cosmétique, pharmaceutique et dermatologique.

Il a ainsi été proposé dans la demande de brevet PCT WO 91/13100, l'utilisation de cyclodextrines substituées par divers groupements, notamment par des fonctions acides carboxyliques.

15 Cette demande de brevet décrit notamment la préparation et l'utilisation de dérivés de cyclodextrine résultant de la réaction de la mono(6-amino 6-désoxy)- β -cyclodextrine avec un anhydride dicarboxylique tel que l'anhydride succinique ou l'anhydride glutarique.


Les dérivés obtenus, porteurs d'une fonction acide carboxylique libre, présentent une meilleure solubilité mais celle-ci reste néanmoins insuffisante pour certaines applications et nécessitent de plus une neutralisation préalable, au moins partielle, des fonctions acides carboxyliques.

20 Après diverses recherches sur les cyclodextrines, on a constaté de façon tout à fait inattendue et surprenante qu'une nouvelle classe de dérivés de cyclodextrine permettait de remédier aux inconvénients rencontrés jusqu'à présent, notamment à ceux des dérivés de cyclodextrine de la demande PCT WO 91/13100.

Les nouveaux dérivés de cyclodextrine selon l'invention présentent non seulement l'avantage d'avoir une solubilité nettement supérieure aux dérivés précédemment connus et utilisés, mais également de pouvoir être employés directement, c'est-à-dire sans neutralisation préalable, tout en étant inoffensifs et bien tolérés par les muqueuses et la peau.

Ces principaux avantages sont dus essentiellement à la présence sur la molécule de cyclodextrine d'un reste d' α -aminoacide de telle sorte qu'en milieu aqueux, les dérivés de cyclodextrine selon l'invention se présentent sous forme bipolaires ou zwitterioniques.

30 La présente invention a donc pour objet à titre de produits industriels nouveaux des dérivés de mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d' α -aminoacide, ces dérivés répondant à la formule générale suivante :



40 dans laquelle :

CD représente l' α , β ou γ cyclodextrine

n est 0 ou 1, et

Z représente un radical divalent choisi parmi :

- 45 (i) -CH₂-
(ii) -O-CH₂-
(iii) -S-CH₂-
(iv)



et

- 55 (v) -O-C₆H₄-CH₂-.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, le radical CD est la β -cyclodextrine.


Parmi les dérivés de cyclodextrine de formule générale (I), on peut notamment citer :

- la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine,

- la mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine, et
- la mono[N-(amino-2' carboxy-2' éthyl-4-phényloxyméthylcarbonyl-1)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine.

La présente invention a également pour objet le procédé de préparation des dérivés de cyclodextrine de formule générale (I), ce procédé pouvant être représenté par le schéma réactionnel suivant :

Schéma I



CD, Z et n ont les mêmes significations que celles données pour la formule (I),

R₁ représente le radical tertiobutyle ou le radical benzyle, et

R₂ représente le radical méthyle ou le radical benzyle.

Ce procédé consiste à faire réagir un α -aminoacide dicarboxylique (2) sous les formes L,D ou racémique (dont la fonction α -aminoacide a été protégée) avec une (6-amino 6-désoxy) cyclodextrine (1) en solution dans un solvant organique tel que le diméthylformamide en présence d'un excès de 1-hydroxybenzotriazole ne dépassant pas 20 % molaire par rapport à l' α -aminoacide dicarboxylique protégé (2) et d'un excès de dicyclohexylcarbodiimide ne dépassant pas 30 % molaire par rapport à l' α -aminoacide dicarboxylique protégé (2). La réaction est généralement réalisée sous agitation jusqu'à la disparition complète des produits de départ puis le mélange est filtré en vue d'éliminer la dicyclohexylurée formée. Après concentration sous vide l'amide obtenu (3) est recristallisé de préférence dans l'eau.


Selon un mode de réalisation préféré, le rapport molaire entre les composés (1) et (2) est généralement compris entre 1 et 1,5.

On procède ensuite à une déprotection des fonctions protégées du composé (3) dans des conditions opératoires qui sont fonction de la nature des groupes protecteurs utilisés.

Ainsi, les groupements benzyloxycarbonyles et benzyles sont déplacés par hydrogénation en présence de Pd/C (5 à 10 %) et les groupements tertiobutyloxycarbonyles sont clivés en présence d'acide trifluoroacétique, les fonctions esters méthyliques étant éliminées par saponification en présence de soude 1N.

La (6-amino 6-désoxy)- β -cyclodextrine (1) est un produit connu, préparé selon des méthodes connues par exemple celle décrite dans le brevet US 5.068.227. Certains des composés de formule (2) sont également disponibles dans le commerce auprès de la Société Bachem : il s'agit en particulier du N-benzyloxycarbonyl aspartate de benzyle (n = 0 et R₁ et R₂ = -CH₂C₆H₅) et du N-benzyloxycarbonyl glutamate de benzyle (Z = -CH₂- et R₁ et R₂ = -CH₂C₆H₅).

Les autres composés de formule (2) et leurs précurseurs dans laquelle Z est différent de -CH₂- sont nouveaux et peuvent être représentés par la formule générale suivante :




dans laquelle :

R représente un atome d'hydrogène ou le radical benzyle,

R_1 représente le radical tertibutyle ou le radical benzyle,
 R_2 représente le radical méthyle ou le radical benzyle, et
 Z' représente un radical divalent choisi parmi :

- (i) $-O-CH_2-$
 (ii) $-S-CH_2-$
 (iii)




et


- (iv) $-O-C_6H_4-CH_2-$.

Les composés intermédiaires de formule (II) sont obtenus selon le schéma réactionnel suivant :

Schéma II



Le groupement $H-Z'-$ représente le radical $HO-CH_2-$, $HS-CH_2-$,



ou $p-HO-C_6H_4-CH_2-$, et

R_1 et R_2 ont les mêmes significations que celles données ci-dessus pour la formule (II).

La synthèse de ces composés consiste à faire réagir en milieu solvant organique, de préférence dans le diméthylformamide, en présence d'hydruure de lithium, du bromoacétate de benzyle (4) sur un ω -hydroxy- ou ω -mercapto- α -aminoacide protégé de formule (5), ce qui permet d'obtenir avec un bon rendement, le dérivé de O ou de S-alkylation de formule (IIa).

L'acide correspondant (IIb) est obtenu par hydrogénation en solution méthanol-chlorure de méthylène en présence de Pd/C 5 %.

Les ω -hydroxy- α -aminoacides protégés de formule (5) sont pour certains connus, en particulier le N-tertiobutyloxycarbonyl tyrosinate de méthyle ($H-Z' = p-HO-C_6H_4-CH_2-$, $R_1 = -C(CH_3)_3$ et $R_2 = -CH_3$) qui est commercialisé par la Société Bachem.

Les autres composés de formule (5) peuvent être facilement obtenus selon les méthodes conventionnelles

de protection des fonctions α -aminoacides à partir d' α -aminoacides tels que la sérine, la thréonine et la cystéine.

Parmi les composés intermédiaires nouveaux de formule (II), on peut notamment citer le N-tertio-butyloxycarbonyl O-(benzyloxycarbonylméthyl)tyrosinate de méthyle et le N-tertio-butyloxycarbonyl O-(carboxyméthyl)tyrosinate de méthyle.

Les dérivés de cyclodextrine selon l'invention trouvent une application dans différents domaines de l'industrie.

Ces dérivés de cyclodextrine peuvent notamment être utilisés tels quels, c'est-à-dire sans inclusion d'actif dans des compositions notamment cosmétiques ou dermatologiques dans le traitement de la peau ou des cheveux, les dérivés de cyclodextrine étant susceptibles d'avoir un effet plastifiant.

Selon cette forme de réalisation, les dérivés de cyclodextrine selon l'invention sont généralement présents à une concentration comprise entre 0,1 et 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

Toutefois, l'utilisation de dérivés de cyclodextrine selon l'invention est plus particulièrement orientée vers la formation de complexes d'inclusion de diverses substances actives. Celles-ci sont de préférence des substances de type lipophile, ou bien encore des produits insolubles ou instables en milieu aqueux et sont choisis plus particulièrement parmi les principes actifs utilisés dans les domaines cosmétique, dermatologique et pharmaceutique.

Comme mentionné ci-dessus, la faculté des dérivés de cyclodextrine selon l'invention de pouvoir se présenter sous forme zwitterionique permet d'accroître la solubilité de ces principes actifs, ce qui, jusqu'à présent, n'avait pu être obtenu de façon satisfaisante.

Parmi les substances actives pouvant former des complexes d'inclusion ou pouvant être stabilisées, on peut notamment mentionner :

- les antioxydants et les antiradicaux libres tels que le butylhydroxytoluène (B.H.T.), le butylhydroxyanisole (B.H.A.), la vitamine E, les dérivés du para-tertiobutylbenzylidène camphre tels que ceux décrits dans le brevet français n° 2.624.508 et en particulier le 3',5'-ditertiobutyl 4'-hydroxy 3-benzylidène camphre,
- les agents anti-acnéiques, anti-vieillessement ou anti-photovieillessement comme l'acide rétinolique et ses isomères ainsi que certains dérivés de ceux-ci tels que ceux décrits dans la demande EP 465.343, dans les demandes WO 91/00793, dans la demande française n° 91 05394 ou encore dans la demande EP 514.264, ou comme le rétinol et ses esters notamment l'acétate ou le palmitate,
- les agents pour lutter contre le psoriasis tels que l'anthraline, les psoralènes, les rétinoïdes aromatiques comme le tigason et ses dérivés ou comme l'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxyphényl]-2-naphtoïque,
- les agents conservateurs et bactéricides, comme les isothiazolones substituées,
- les agents favorisant la repousse des cheveux ou évitant leur chute tels que le Minoxidil et ses dérivés ou les produits décrits dans les demandes de brevet français 2.606.635, 2.607.505, 2.618.068, 2.654.101, 2.663.327, et les demandes EP 304.649, EP 304.665, EP 353.323, EP 303.871, EP 356.271, EP 464.034, EP 177.581, EP 420.507, EP 408.442, et EP 459.890,
- les filtres solaires,
- les agents d'hydratation et/ou de plastification du stratum cornéum tels que les α -hydroxyacides, les dérivés de thiamorpholinone tels que ceux décrits dans les brevets français n° 2.525.106 et 2.525.220, l'acide pyrrolidone carboxylique et les sérines, les dérivés salicylés tels que ceux décrits dans la demande EP 378.936 et notamment l'acide n-octanoyl-5-salicylique,
- les agents de reconstitution de la barrière lipidique tels que les céramides et leurs dérivés, en particulier ceux décrits dans le brevet français n° 2.588.256 ainsi que dans les demandes EP 420.722 et EP 500.437,
- les colorants capillaires difficilement solubles en milieu aqueux tels que les colorants anthraquinoniques, les colorants azoïques et les dérivés nitrés de la série benzénique, ou encore les colorants pouvant être stabilisés tels que les indoles et les indolines substitués,
- les agents dépigmentants tels que l'hydroquinone, l'acide kojique, l'arbutine et ses dérivés,
- les agents anti-inflammatoires tels que les inhibiteurs de lipoxigénase et/ou de cyclooxygénase,
- des stéroïdes comme l'hydrocortisone et l'hydroxy-17 corticostérone,
- des agents anti-viraux et anticancéreux comme le 5-fluorouracile.

Les compositions cosmétiques, pharmaceutiques ou dermatologiques contenant de tels complexes d'inclusion peuvent se présenter sous diverses formes, notamment sous forme de lotions aqueuses ou hydroalcooliques, de gels ou de dispersions et sont présents en une proportion comprise entre 0,1 et 30 % par rapport au poids total des compositions.

Les dérivés de cyclodextrine selon l'invention sont également susceptibles de former des complexes d'inclusion avec certains sels métalliques, notamment les sels de métaux intervenant dans le processus d'oxydo-

réduction lors de la coloration ou décoloration des cheveux ou lors de la coloration ou de la lutte contre le vieillissement de la peau.

Les dérivés de cyclodextrine selon l'invention trouvent en outre certaines applications dans la formation de complexes avec des molécules d'acides aminés par l'intermédiaire d'un métal de transition permettant ainsi de séquestrer ces métaux, les dérivés de cyclodextrine selon l'invention étant alors susceptibles d'agir en tant qu'agents protecteurs ou de détoxification de ces métaux, notamment dans des produits cosmétiques.

Bien d'autres utilisations peuvent être envisagées pour les dérivés de cyclodextrine selon l'invention notamment en électrophorèse capillaire, comme phase chirale-chromatographique, ou encore pour la formation de complexes dans le domaine agro-alimentaire.

On va maintenant donner à titre d'illustration plusieurs exemples de préparation des dérivés de cyclodextrine selon l'invention et d'utilisation de ces dérivés.

EXEMPLES DE PREPARATION

La révélation des chromatographies sur couche mince de silice (CCM) a été effectuée par UV ou après pulvérisation de H_2SO_4 10 % puis chauffage ou par la ninhydrine en solution dans l'éthanol puis chauffage. Les spectres de RMN ont été enregistrés sur un appareil Bruker 270 (Référence interne TMS).

EXEMPLE 1 : Préparation de la mono[N-(amino-4 carboxy-4butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

(a) Mono [N-(benzyloxycarbonylamino-4 benzyloxycarbonyl-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

A une solution de 0,635 g ($1,6 \cdot 10^{-3}$ mole) de N-benzyloxycarbonyl α -glutamate de benzyle dans 20 ml de diméthylformamide (DMF), on ajoute 0,209 g de 1-hydroxybenzotriazole et 0,385 g ($1,855 \cdot 10^{-3}$ mole) de dicyclohexylcarbodiimide. Après 30 minutes d'agitation à 20°C, on ajoute 1,5 g ($1,325 \cdot 10^{-3}$ mole) de mono(6-amino-6-désoxy)- β -cyclodextrine et le mélange est agité 24 heures à température ambiante. Après filtration de la dicyclohexylurée, la solution organique est concentrée sous vide. Le solide obtenu est recristallisé dans l'eau et se présente après séchage sous forme d'un solide incolore ayant un point de fusion supérieur à 240°C (Rdt : 68-78%).

CCM : Rf = 0,38 (Eluant : Acétate d'éthyle : 36 % ; isopropanol 36 % ; ammoniacale concentrée : 21 % ; eau 7 %)

RMN (DMSO-d_6) : $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}$ = 1,83-1,93 ; $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}$ = 2,25 ; CH-CH_2 = 4,10 ; anomériques = 4,82 ; $\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ = 5,01 ; $\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ = 5,10 ; C_6H_5 = 7,31-7,34.

(b) Mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

A une solution de 1,5 g ($1 \cdot 10^{-3}$ mole) du composé préparé ci-dessus en (a) dans un mélange de 20 ml d'eau et de 50 ml de méthanol, on ajoute 200 mg de Pd/C (10 %) puis agite vigoureusement à 20°C sous hydrogène pendant 6 heures. Après élimination de l'hydrogène, le mélange est filtré, le catalyseur est rincé par 3 fois 5 ml d'eau et le filtrat est concentré sous vide. On obtient un solide incolore ayant un point de fusion supérieur à 240°C avec un rendement de 86%.

CCM : Rf = 0,20 (Eluant : identique à 1(a) ci-dessus)

RMN(DMSO-d_6) : $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}$ = 1,90 ; $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}$ = 2,29 ; anomériques = 4,82-4,85 ; β -CD = 3,29-3,35 et 3,56-3,65.

Solubilité dans l'eau supérieure à 1000 g/l.

EXEMPLE 2 : Préparation de la mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

(a) Mono [N-(benzyloxycarbonylamino-3 benzyloxycarbonyl-3 propionyl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine

A une solution de 0,611 g ($1,6 \cdot 10^{-3}$ mole) de N-benzyloxycarbonyl-aspartate de benzyle dans 20 ml de diméthylformamide, on ajoute 0,209g de 1-hydroxybenzotriazole et 0,385 g ($1,855 \cdot 10^{-3}$ mole) de dicyclohexylcarbodiimide. Après 30 minutes d'agitation à 20°C, on ajoute 1,5 g ($1,325 \cdot 10^{-3}$ mole) de mono(6-amino-6-désoxy)- β -cyclodextrine, puis on agite le mélange pendant 24 heures à température ambiante.

On filtre la dicyclohexylurée formée puis la solution organique est concentrée sous vide. Le solide obtenu est recristallisé dans l'eau.

On obtient un solide incolore, de point de fusion supérieur à 240°C, avec un rendement compris entre 71 et 86 %.

CCM : Rf = 0,62 (Eluant : acétate d'éthyle : 36 % ; isopropanol : 36 %, ammoniacale concentrée : 21 % ; eau : 7 %)

RMN : (DMSO-d_6) = CH_2CO : 3,05 et 3,15 ; β -CD : 3,30 et 3,68 ; anomériques : 4,82 ; hydroxyles : 5,61-5,74 ; C_6H_5 : 7,33-7,37.

(b) *Mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine*

A une solution de 1,48 g ($1 \cdot 10^{-3}$ mole) du composé obtenu ci-dessus en (a) dans un mélange de 20 ml d'eau et de 50 ml de méthanol, on ajoute 200 mg de Pd/C (10 %), puis agite vigoureusement, à 20°C, sous hydrogène pendant 6 heures.

Après élimination de l'hydrogène, le mélange est filtré, le catalyseur est rincé 3 fois par 5 ml d'eau, puis le filtrat est concentré sous vide.

On obtient un solide incolore, de point de fusion supérieur à 240°C, avec un rendement de 91 %.

Solubilité dans l'eau supérieure à 1000 g/l.

CCM : Rf = 0,375 (Eluent identique à celui utilisé en 2 (a) ci-dessus)

RMN : (DMSO d_6) = CH_2CO : 2,90 ; β -CD : 3,31 et 3,73 ; anomériques : 4,82 ; hydroxyles : 5,65-5,79.

EXEMPLE 3 : Préparation de la mono[N-(amino-2'carboxy-2'éthyl-4-phényloxyméthylcarbonyl-1)amino]-6 désoxy β-cyclodextrineA) *Mono [N-(tertiobutyloxycarbonylamino-2'méthoxycarbonyl-2' éthyl-4-phényloxyméthylcarbonyl-1)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine*

(a) A une solution de 5,5 g ($18,7 \cdot 10^{-3}$ mole) de N-tertiobutyloxycarbonyltyrosinate de méthyle, on ajoute à température ambiante, 0,165 g ($20,5 \cdot 10^{-3}$ mole) d'hydruure de lithium. Après 15 minutes d'agitation, on ajoute 4,719 g ($20,5 \cdot 10^{-3}$ mole) de bromoacétate de benzyle. Le mélange est agité pendant 5 heures à 40°C, puis concentré sous vide et le produit d'O-alkylation est séparé par chromatographie sur silice par élution à l'aide d'un mélange d'acétate d'éthyle 50 % et d'éther de pétrole 50 %. On obtient une huile incolore, avec un rendement de 82 %.

CCM : Rf = 0,92 (Eluent : acétate d'éthyle 100 %) ; Rf = 0,30 (éluent acétate d'éthyle 50 % ; cyclohexane 50 %).

RMN (CDCl_3) : $(\text{CH}_3)_3\text{C}$ = 1,42 ; $\text{CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4$ = 3,05 ; OCH_3 = 3,7 ; CHCH_2 = 4,6 ; OCH_2CO = 4,64 ; NH = 4,95 ; $\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ = 5,25 ; CH aro(aryloxy) = 6,83 et 7,03 ; aro(benzyle) = 7,27-7,37 ;

(b) Le produit obtenu en (a) est repris par 50 ml d'un mélange de méthanol 50 % et de chlorure de méthylène 50 %, puis on ajoute à la solution 50 mg de Pd/C (5 %), et on agite sous atmosphère d'hydrogène.

Lorsque l'absorption d'hydrogène a cessé (après environ 50 mn), le milieu est filtré, le catalyseur est rincé 2 fois par 10 ml de chlorure de méthylène, puis la solution est évaporée.

On obtient une huile jaune avec un rendement de 96 %.

CCM : Rf = 0,45 (éluent : acétate d'éthyle 100 %)

Rf = 0,15 (éluent : acétate d'éthyle 50 %-cyclohexane 50 %).

RMN (CDCl_3) : $(\text{CH}_3)_3\text{C}$ = 1,45 ; $\text{CH}_2\text{-C}_6\text{H}_4$ = 3,01 ; OCH_3 = 3,72 ; CHCH_2 = 4,53 ; OCH_2CO = 4,64 ; NH = 4,95 ; CH aro(aryloxy) = 6,81 et 7,02.

(c) L'acide ainsi obtenu est alors mis à réagir avec la (6-amino-6-désoxy)-β-cyclodextrine dans les mêmes conditions que celles de l'exemple 1(a).

On obtient le produit attendu sous forme d'un solide incolore avec un rendement de 78 %.

CCM : Rf = 0,30 (Eluent : acétate d'éthyle 36 % ; isopropanol 36 % ; ammoniacque concentrée 21 % ; eau 7 %)

RMN(DMSO+ D_2O) : $\text{C}(\text{CH}_3)_3$ = 1,43 ; $\beta\text{-C+OCH}_3$ = 3,2-3,4 et 3,5-3,6 ; CHCH_2 = 4,50 ; OCH_2CO = 4,6 ; CH aro(aryloxy) = 6,83 et 7,08.

B) *Mono[N-(amino-2'carboxy-2'éthyl-4-phényloxyméthylcarbonyl-1)amino]-6-désoxy β-cyclodextrine*

Le composé obtenu précédemment en (A)(c) est dissout dans 10 ml d'une solution 1:1 d'acide trifluoroacétique dans le chlorure de méthylène. Après 2 heures à température ambiante, on concentre le mélange, le reprend dans 10 ml d'eau, puis ajoute 30 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium 1N. Après 3 heures d'agitation à température ambiante, le milieu est concentré sous vide et l'on reprend le solide par de l'eau. Après purification sur une colonne de Sephadex, le produit est lyophilisé.

On obtient une poudre incolore, de point de fusion supérieur à 240°C, avec un rendement de 76 %.

RMN (DMSO) : β -CD : 3,2-3,4 et 3,5-3,6 ; anomériques = 4,85 ; aromatiques = 6,87 et 7,12.

CMM : Rf = 0,23 (Eluent : acétate d'éthyle : 36 % ; isopropanol 36 % ; ammoniacque concentrée 21 %, eau 7 %).

Solubilité dans l'eau : 900 g/l.

EXEMPLES D'UTILISATION**EXEMPLE A : Complexe d'inclusion du minoxidil dans la mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine**

5

A une solution de 114 mg du composé préparé à l'exemple 2(b) dans 0,3 ml d'eau, on ajoute à 70°C, 22 mg de minoxidil. Après 15 minutes d'agitation à 70°C, le mélange est refroidi à la température ambiante, puis filtré. La solution limpide obtenue est lyophilisée.

10

D'après les dosages en HPLC et en RMN, ce complexe contient 15,4 % de minoxidil, ce qui correspond à un rapport de 1,1 molécule de minoxidil pour 1 molécule du composé de l'exemple 2(b).

L'inclusion du minoxidil dans le dérivé de cyclodextrine selon l'exemple 2(b) accroît sa solubilité dans l'eau d'un facteur de l'ordre de 40, celle-ci étant alors de 110 g/l.

15

EXEMPLE B : Complexe d'inclusion du minoxidil dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine

Selon le même mode opératoire que décrit à l'exemple A, on prépare un complexe d'inclusion du minoxidil dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino-6 désoxy] β-cyclodextrine à partir de 128 mg du composé préparé à l'exemple 1(b) et de 21 mg de minoxidil.

20

D'après le dosage en RMN, ce complexe contient 1 molécule de minoxidil pour 1 molécule du composé de l'exemple 1(b).

L'inclusion du minoxidil dans le dérivé de cyclodextrine selon l'exemple 1(b) accroît sa solubilité dans l'eau d'un facteur de l'ordre de 40, celle-ci étant alors de 110 g/l.

25

EXEMPLE C : Complexe d'inclusion du 5-fluorouracile dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine

Selon le même mode opératoire que décrit à l'exemple A, on prépare un complexe d'inclusion du 5-fluorouracile dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino-6 désoxy] β-cyclodextrine à partir de 128 mg du composé préparé à l'exemple 1(b) et de 13 mg de 5-fluorouracile.

30

D'après le dosage en RMN, ce complexe contient 1 molécule de 5-fluorouracile pour 1 molécule du composé de l'exemple 1(b).

L'inclusion du 5-fluorouracile dans le dérivé de cyclodextrine selon l'exemple 1(b), accroît sa solubilité dans l'eau d'un facteur de l'ordre de 100, celle-ci étant alors de 80 g/l.

35

EXEMPLE D : Complexe d'inclusion de l'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxy phényl]-2-naphtoïque dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine

Selon le même mode opératoire que décrit à l'exemple A, on prépare un complexe d'inclusion de l'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxy phényl]-2-naphtoïque dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino-6 désoxy] β-cyclodextrine à partir de 128 mg du composé préparé à l'exemple 1(b) et de 10 mg d'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxy phényl]-2-naphtoïque.

40

D'après le dosage en RMN, ce complexe contient 1 molécule d'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxy phényl]-2-naphtoïque pour 8 molécules du composé de l'exemple 1(b).

45

L'inclusion de l'acide 6-[3-(1-adamantyl)-4-méthoxy phényl]-2-naphtoïque dans le dérivé de cyclodextrine selon l'exemple 1(b) accroît sa solubilité dans l'eau d'un facteur de l'ordre de 1.000, celle-ci étant alors de 4 g/l.

50

EXEMPLE E : Complexe d'inclusion de l'hydroxy-17 corticostérone dans la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β-cyclodextrine

Selon le même mode opératoire que décrit à l'exemple A, on prépare un complexe d'inclusion de l'hydroxy-17 corticostérone dans la mono-(6-γ-glutamyl-amino-6 désoxy)-β-cyclodextrine à partir de 128 mg du composé préparé à l'exemple 1(b) et de 20 mg d'hydroxy-17 corticostérone.


55

D'après le dosage en RMN, ce complexe contient 1 molécule d'hydroxy-17 corticostérone pour 2 molécules du composé de l'exemple 1(b).

L'inclusion de l'hydroxy-17 corticostérone dans le dérivé de cyclodextrine selon l'exemple 1(b) accroît sa solubilité dans l'eau d'un facteur de l'ordre de 200, celle-ci étant alors de 11 g/l.

Revendications

1. Dérivés de mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d' α -aminoacide, caractérisés par le fait qu'ils répondent à la formule générale suivante :




dans laquelle :

CD représente l' α , β ou γ cyclodextrine

n est 0 ou 1, et

Z représente un radical divalent choisi parmi :

- (i) $\text{-CH}_2\text{-}$
- (ii) $\text{-O-CH}_2\text{-}$
- (iii) $\text{-S-CH}_2\text{-}$,
- (iv)




et

(v) $\text{-O-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{-}$.

2. Dérivés de cyclodextrine selon la revendication 1, caractérisés par le fait que la cyclodextrine est la β -cyclodextrine.
3. Dérivés de cyclodextrine selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisés par le fait qu'ils sont choisis parmi :
- la mono[N-(amino-4 carboxy-4 butyryl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine,
 - la mono[N-(amino-3 carboxy-3 propionyl)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine, et
 - la mono[N-(amino-2' carboxy-2' éthyl-4-phényloxyméthylcarbonyl-1)amino]-6 désoxy β -cyclodextrine.

4. Procédé de préparation des dérivés de cyclodextrine selon les revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que l'on fait réagir en solution dans un solvant organique un α -aminoacide dicarboxylique dont la fonction α -aminoacide a été protégée et ayant la formule suivante :



dans laquelle :

Z et n sont tels que définis à la revendication 1,

R₁ représente le radical tertiobutyle ou le radical benzyle, et


R₂ représente le radical méthyle ou le radical benzyle,

avec une mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine de formule : CDNH_2

dans laquelle : CD est tel que défini à la revendication 1, la réaction étant effectuée en présence de 1-hydroxybenzotriazole et de dicyclohexylcarbodiimide, et que l'on procède ensuite à la déprotection de la fonction α -amino acide protégée.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé par le fait que le solvant organique est le diméthylformamide.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé par le fait que le 1-hydroxybenzotriazole est utilisé en un excès molaire ne dépassant pas 20 % par rapport à l' α -aminoacide dicarboxylique protégé et le dicyclohexylcarbodiimide en un excès molaire ne dépassant pas 30 % par rapport à l' α -aminoacide dicarboxylique protégé.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé par le fait que le rapport molaire entre la mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine et l' α -amino acide dicarboxylique protégé est compris entre 1 et 1,5.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 7, caractérisé par le fait que la mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine est la mono(6-amino 6-désoxy)- β -cyclodextrine.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisé par le fait que la déprotection est effectuée par hydrogénation en présence de Pd/C (5 à 10 %) lorsque dans la formule (2), R_1 et R_2 représentent un radical benzyle.
10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisé par le fait que la déprotection est effectuée en présence d'acide trifluoroacétique lorsque dans la formule (2), R_1 représente un radical tertibutyle, la déprotection de la fonction ester étant obtenue par saponification en présence de soude.
11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 9, caractérisé par le fait que l' α -amino acide dicarboxylique protégé est choisi parmi :
- le N-benzyloxycarbonyl aspartate de benzyle,
 - le N-benzyloxycarbonyl glutamate de benzyle, et
 - le N-tertio-butyloxycarbonyl O-carboxyméthyl tyrosinate de méthyle.
12. Produits intermédiaires dans la synthèse des dérivés de cyclodextrine caractérisés par le fait qu'ils répondent à la formule générale suivante :



dans laquelle :

R représente un atome d'hydrogène ou le radical benzyle,
 R_1 représente le radical tertibutyle ou le radical benzyle,
 R_2 représente le radical méthyle ou le radical benzyle, et
 Z' représente un radical divalent choisi parmi :


- (i) -O-CH₂-
- (ii) -S-CH₂-
- (iii)



et

(iv) -O-C₆H₄-CH₂- .


13. Produits intermédiaires selon la revendication 12, caractérisés par le fait qu'ils sont choisis parmi : le N-tertio-butyloxycarbonyl O-(benzyloxycarbonylméthyl)tyrosinate de méthyle et le N-tertio-butyloxycarbonyl O-(carboxyméthyl)tyrosinate de méthyle.
14. Procédé de préparation des produits intermédiaires selon les revendications 12 et 13, caractérisé par le fait qu'il consiste à faire réagir dans un solvant organique, en présence d'hydrure de lithium, du bromoacétate de benzyle sur un ω -hydroxy- ou ω -mercapto- α -amino acide protégé de formule :



(5)

dans laquelle :


le groupement HZ'- représente le radical HO-CH₂, HS-CH₂-,



ou p-OH-C₆H₄-CH₂-,

R₁ représente le radical tertibutyle ou le radical benzyle, et

R₂ représente le radical méthyle ou le radical benzyle, et à soumettre éventuellement le produit obtenu de formule :



à une déprotection par hydrogénation en solution méthanol/chlorure de méthylène en présence de Pd/C en vue d'obtenir l'acide correspondant.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé par le fait que le ω-hydroxy α-amino acide protégé de formule (5) est le N-tertiobutyloxycarbonyl tyrosinate de méthyle.

16. Composition cosmétique ou dermatologique, caractérisée par le fait qu'elle contient de 0,1 à 10 % en poids d'au moins un dérivé de cyclodextrine selon les revendications 1 à 3 ou obtenu selon les revendications 4 à 11.

17. Utilisation des dérivés de cyclodextrine selon les revendications 1 à 3, pour la formation de complexes d'inclusion de substances actives de nature lipophile ou insolubles ou instables en milieu aqueux.

18. Utilisation selon la revendication 17, caractérisée par le fait que les substances actives sont choisies parmi les antioxydants, les antiradicaux libres, les agents anti-acnéiques, les agents anti-vieillessement, les agents anti-psoriatiques, les agents conservateurs, les agents bactéricides, les agents favorisant la repousse des cheveux, les agents d'hydratation et/ou de plastification du stratum cornéum, les filtres solaires, les agents de reconstitution de la barrière lipidique, les colorants capillaires, les agents dépigmentants, les agents anti-inflammatoires, les agents anti-viraux, les agents anticancéreux et les stéroïdes.

19. Composition cosmétique ou dermatologique, caractérisée par le fait qu'elle contient un complexe d'inclusion formé à l'aide d'un dérivé de cyclodextrine selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 et d'au moins une substance active telle que définie selon la revendication 18.

20. Composition cosmétique ou dermatologique selon la revendication 19, caractérisée par le fait qu'elle contient le complexe d'inclusion en une proportion comprise entre 0,1 et 30 % par rapport au poids total de la composition.

THIS PAGE BLANK (USPTO:



(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : 94401069.3

(51) Int. Cl.⁵ : **C08B 37/16, C07C 271/22, A61K 7/48**

(22) Date de dépôt : 11.05.94

(30) Priorité : 13.05.93 FR 9305782

(43) Date de publication de la demande : 17.11.94 Bulletin 94/46

(84) Etats contractants désignés : CH DE ES FR GB IT LI NL

(88) Date de publication différée de rapport de recherche : 21.12.94 Bulletin 94/51

(71) Demandeur : L'OREAL
14, Rue Royale
F-75008 Paris (FR)


(72) Inventeur : Galons, Hervé
57, Boulevard de Vaugirard
F-75015 Paris (FR)
Inventeur : Gnaim, Jellal
Aart van der Leeuwlaan 966
NL-2624 LZ Delft (NL)
Inventeur : Maignan, Jean
8, rue Halévy
F-93290 Tremblay les Gonesse (FR)

(74) Mandataire : Stalla-Bourdillon, Bernard
Cabinet Nony
29, rue Cambacérès
F-75008 Paris (FR)

(54) Dérivés de mono (6-amino 6-désoxy)cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d'alpha-aminoacide, leur procédé de préparation et leurs utilisations.

(57) Dérivés de mono(6-amino 6-désoxy) cyclodextrine substituée en position 6 par un reste d'alpha-aminoacide.

Ces dérivés répondent à la formule générale suivante :




dans laquelle :

CD représente l'alpha, beta ou gamma cyclodextrine

n est 0 ou 1, et

Z représente un radical divalent choisi parmi :

- (i) -CH₂-
- (ii) -O-CH₂-
- (iii) -S-CH₂-
- (iv)



et

- (v) -O-C₆H₄-CH₂-

Ces dérivés trouvent une application pour la formation de complexes d'inclusion de substances actives et peuvent être utilisés dans différents domaines en particulier en cosmétique, en dermatologie et en pharmacie.

EP 0 624 599 A3



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 94 40 1069

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cls)
A	TETRAHEDRON LETTERS, vol.33, no.2, 7 Janvier 1992 pages 209 - 212 HÉLÈNE PARROT-LOPEZ ET AL. 'Vectorised Transport of Drugs : Synthesis of a new Glycosyl Derivative of Beta-Cyclodextrin' * page 211, alinéa 2 *	4-8	C08B37/16 C07C271/22 A61K7/48
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 241 (C-604) 6 Juin 1989 & JP-A-01 051 402 (TOSOH CORP) 27 Février 1989 * abrégé *		
X	JOURNAL OF CHEMICAL SOCIETY, CHEMICAL COMMUNICATIONS, 1975 pages 160 - 161 IAN J. CLIMIE ET AL. 'Labelling of Amino-acid Side-chains with ¹³ C-labelled Electrophiles; Potential Application to the Probing of Active Sites of Enzymes.'	12,14	
X	TETRAHEDRON, vol.38, no.5, 1982 pages 697 - 711 IAN J. G. CLIMIE ET AL. 'C-Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy as a probe of Enzyme Environment' * page 697, formule 1, f*	12,14	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cls) C08B C07C
A	JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY, vol.124, 1976, AMSTERDAM pages 92 - 96 MASAMI MAKITA ET AL. 'Gas-liquid chromatography of the N-isobutyloxycarbonyl methyl esters of non-protein amino acids.'		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 24 Octobre 1994	Responsable Lensen, H
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie en principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons A : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul V : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : articles plus technologiques O : divulgation non-écrite F : document interne			

EPO FORM 150 (11/93) (FR/CH)



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 94 40 1069

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.9)
D, A	WO-A-91 13100 (AUSTRALIAN COMMERCIAL RESEARCH & DEVELOPMENT LIM.) * exemples 69-70 * -----		
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CI.9)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 24 Octobre 1994	Examinateur Lensen, H
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non écrite P : document intermédiaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1503 (01.91) (FR/EN)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)